

Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 4. Hérons (Ardeidae)

par Claire VOISIN & Jean-François VOISIN

Résumé. — Les types de dix-huit taxons de Hérons (*Ardeidae*) sont passés en revue de façon critique. Des lectotypes et des paralectotypes sont désignés pour *Ardea novae-hollandiae* Vieillot, 1817 et pour *Ardea australasie* Vieillot, 1823 (les deux descriptions sont fondées sur les mêmes spécimens), ainsi que pour *Ardea bilineata* Cuvier in Lesson 1831. Quatre spécimens supplémentaires, portant la mention « type » mais qui n'en sont pas au sens du Code, ont aussi été examinés.

Mots-clés. — Oiseaux, types, Ardeidés.

List of the types of birds in the collections of the Muséum national d'Histoire naturelle of Paris.
4. Herons (Ardeidae).

Abstract. — The types of eighteen heron (*Ardeidae*) taxa are reviewed critically. Lectotypes and paralectotypes are designated for *Ardea novae-hollandiae* Vieillot, 1817, *Ardea australasie* Vieillot, 1823 (both descriptions are based on the same specimens), and for *Ardea bilineata* Cuvier in Lesson, 1831. Four additional specimens, indicated as « types », but which are not according to the meaning of type in the Code of Zoological Nomenclature, were also examined.

Key-words. — Birds, types, Ardeidae.

C. VOISIN & J.-F. VOISIN, Muséum national d'Histoire naturelle, Laboratoire de Zoologie, Mammifères et Oiseaux, 55 rue de Buffon, F-75231 Paris cedex 05

CATALOGUE

Ce travail fait suite à trois articles précédents concernant les types d'oiseaux du Muséum national d'Histoire naturelle (J.-F. VOISIN 1992, 1995; C. VOISIN 1993) et suit les mêmes conventions.

Pour chaque spécimen nous avons noté successivement :

- le nom sous lequel il a été décrit;
- la référence de la description;
- la catégorie de type à laquelle il appartient;
- le numéro d'inscription au Catalogue Général;
- le nom qu'il porte dans la nomenclature actuelle. Nous avons en général suivi HANCOCK & ELLIOTT (1978).

Les mentions qui se trouvent sous le socle ont toutes été recopiées en commençant, dans la mesure où il est possible de les identifier, par les plus anciennes. Elles s'échelonnent pour

certaines de la fin du XVIII^e siècle à nos jours. Les mentions portées sur les étiquettes des socles ont également été recopiées. Les retours à la ligne sont indiqués par le symbole /. Nous en avons respecté l'orthographe.

REMARQUES

Les numéros de catalogue compris entre 1 à 15566 et non précédés de la mention N. C. (Nouveau Catalogue) correspondent à l'ancien catalogue établi au XIX^e siècle. Les numéros précédés de la mention N. C. correspondent au catalogue des oiseaux montés de la Grande Galerie, établi durant la première moitié du XX^e siècle par le Professeur J. BERLIOZ. Les numéros précédés de la mention C. G. et d'un millésime correspondent au Catalogue Général actuellement en vigueur. Tous ces documents sont conservés au laboratoire des Mammifères et Oiseaux.

Les socles de quelques spécimens portent la mention « Type de Buffon » ou bien « type de la planche de Buffon. » Bien qu'ils aient servi à BUFFON pour ses descriptions et pour l'illustration de son *Histoire Naturelle des Oiseaux* dont la première édition date de 1771-1786, ils ne sauraient être considérés comme des types au sens du *Code de Nomenclature Zoologique* (1985) car BUFFON n'employait pas la nomenclature binominale de LINNÉ.

TYPES DE TAXONS DONT LA DÉNOMINATION EST ENCORE EN VIGUEUR

Ardea heliosylus Lesson, 1828

Lesson, in DUPERREY (ed.) *Voyage de la Coquille 1822-1825*; LESSON & GARNOT *Zool.* 1: 722, *Atlas, Zool. Oiseaux* planche 44.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 236.

Zonerodius heliosylus (Lesson, 1828).

Inscriptions sous le socle :

Botaurus heliosylus / (Less.) / Lesson et Garnot / N. Guinée / Exped. Duperrey / Type de l'espèce / [écriture ancienne] Butor tigré n. Guinée / Zonerodius heliosylus / (Less.) / (Type) / La Coquille – N. Guinée / N. C. 158 [écriture plus récente]

Inscriptions sur l'étiquette :

Butor tigré de N. Guinée / Zonerodius heliosylus / (Less.) / (Type) / La Coquille N. Guinée.

Remarques : la description de LESSON, précise et détaillée, comprend une page entière dans le livre et une planche en couleur du spécimen dans l'atlas. L'oiseau a été tiré par M. Roland « sur les rives du havre de Doréry, Nouvelle Guinée ». LESSON a fait partie de l'expédition Duperrey sur la corvette *la Coquille*. L'auteur de la description est donc également le collecteur.

Buphus bacchus Bonaparte, 1855

Bonaparte, *Consp. Gen. Avium* : 127.

Type par monotypie.

C. G. 239 – 239.

Ardeola bacchus (Bonaparte, 1855).

Inscriptions sous le socle :

Ardea bacchus. (Bp.) / (Type) / Calcutta / par M Barbe / juillet 1840 / [écriture ancienne] / 13948 B [écrit au crayon] N. C. n° 100 / Crabier de Chine / *Ardeola r. bacchus* / (Bp.) / type / M. Barbe / Calcutta / [écriture plus récente].

Inscriptions sur l'étiquette :

Crabier de Chine / *Ardeola r. bacchus* / (Bp.) / Type / M. Barbe / Calcutta.

Remarque : dans sa diagnose BONAPARTE précise que le spécimen décrit a bien été rapporté par M. Barbe.

Ardea leuconotus Wagler, 1827

Wagler, *Systema Avium*, *Ardea* : 189 sp. 33.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 245.

Gorsachius leuconotus (Wagler, 1827).

Inscriptions sous le socle :

Ardea leuconotos, Wag. type de / Wagler. / *Ardea leuconotos*. (Tem) / Bihoreau à dos blanc / [écriture ancienne] Sénégal par Watrin. 1817 / N. C. 124 *Nycticorax leuconotus* / (Wag.) Type / 14013 Bihoreau à dos blanc [mention au crayon] Bihoreau à dos blanc / *Nycticorax leuconotus* (Wagl.) / M. Watrin. Sénégal [écriture récente].

Inscriptions sur l'étiquette :

Bihoreau à dos blanc / *Nycticorax leuconotus* / (Wagl.) Type / M. Watrin Sénégal.

Remarques : WAGLER a séjourné à Paris en 1825 lors de la rédaction de son livre *Systema Avium* (STRESEMANN 1951). Dans sa description, l'auteur précise que le type se trouve au Muséum de Paris et provient de Sénégal. La référence à TEMMINCK sous le socle sans la mention « type » et sans renvoi à une planche coloriée ou à une description montre que ce spécimen n'est pas un type de TEMMINCK.

Nycticorax goisagi Temminck, 1835

Temminck, *Planches coloriées*, Livre 98. Description et planches en couleurs, planche 582.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 241.

Gorsachius goisagi (Temminck, 1835).

Inscriptions sous le socle :

Botaurus melanolophus / (Raffl.) / *Gorsakius typus* / Puch. type. / échangé à Temminck / 1836 [écriture ancienne] / 14006 / décrit Consp. Av. II p.138 / V.pl. Col. 582 / [écriture ancienne] / N. C. n° 148 / Petit butor de Malaisie / *Gorsachius goisagi* / (Temm) / Japon : [écriture plus récente].

Inscriptions sur l'étiquette :

Petit Butor du Japon / *Gorsachius goisagi* / (Temm.) / Japon.

Remarques : c'est ce spécimen qui a servi de modèle à la planche coloriée de TEMMINCK lors de la figuration de l'espèce. Il fut désigné comme « type de la planche » dès cette époque, d'où les mentions sous le socle : « V. Pl. Col. 582 » et « échangé à Temminck ».

Par la suite BONAPARTE (1857) s'est mépris sur l'identité de *Gorsachius melanolophus* (Raf-fles) qu'il considère comme l'adulte de *Gorsachius goisagi* (Temm.), alors qu'il en voit la forme juvénile dans *Gorsachius goisagi* lui même (voir également la partie : espèces considérées à tort comme types). Ainsi lorsque BONAPARTE crée le genre *Gorsachius*, il ne cite que l'espèce *goisagi*. La confusion qu'il fait avec *Gorsachius melanolophus* n'empêche pas de considérer *Gorsachius goisagi* comme espèce-type du genre *Gorsachius* car, bien qu'il ait cru avoir affaire à un individu juvénile, BONAPARTE a correctement identifié ce taxon. PUCHERAN ne semble jamais avoir décrit le genre *Gorsachius*, qu'il faut donc attribuer à BONAPARTE.

Ardea cinerea monicae Jouanin & Roux, 1963.

Jouanin & Roux, *Oiseaux et Rev. fr. Orn.* 33 : 103-106.

Premier spécimen, holotype par désignation originale.

C. G. 1961 - 4.

Ardea cinerea monicae Jouanin & Roux, 1963.

Étiquette rouge :

Ardea cinerea monicae / Jouanin et Roux 1963 / C. G. 1961 n° 4 / *Ardea cinerea monicae*
Jouanin et Roux 1963 / O.R.F.O. 33 : 104.

Étiquette blanche :

Ardea cinerea monicae / Jouanin et Roux / Loc. : île Are1, banc d'Arguin, 20 juin 1960 /
adulte nicheur / Type / Coll. : Mr. J. Dragesco / Loc. : Mauritanie / C. G. 1961 n° 4.

Remarque : ce spécimen désigné comme « type » dans la description est en fait l'holotype par désignation originale (Code international de Nomenclature Zoologique, 3^e éd., 1985, article 73 A I).

Second spécimen, paratype par désignation originale implicite

C. G. : 1961-770.

Ardea cinerea monicae Jouanin & roux, 1963.

Étiquette rouge :

Ardea cinerea monicae / Jouanin et Roux / C. G. 1961 n° 770 / paratype.

Étiquette blanche :

Col. Mr. Dragesco / Loc. Mauritanie / C. G. 1961 n° 770 / *Ardea cinerea monicae* /
Jouanin et Roux / Loc. île Kiaone-ouest / Banc d'Arguin / juin 1960 / adulte nicheur.

Remarque : ce second spécimen, mentionné mais non désigné dans la publication originale, a lui aussi servi à établir la description de l'espèce et constitue donc un paratype (Code international de Nomenclature Zoologique, 3^e éd., 1985, article 72 B V).

Ardea purpurea bournei de Naurois, 1966.

de Naurois, *L'Oiseau et Rev. fr. Orn.* 36 : 89.

Premier spécimen, holotype par désignation originale.

C. G. 1966-891.

Ardea purpurea bournei de Naurois, 1966

Étiquette rouge :

Ardea purpurea bournei / de Naurois 1966 / C. G. 1966 n° 891 / *Ardea purpurea* / *bournei* de Naurois 1966 / ORFO 36 : 89.

Étiquette blanche :

Coll. Abbé R. de Naurois / Loc. Ile du Cap Vert / C.G.1966-891/ *Ardea purpurea bournei* Naurois / Loc. Ilha de Santiago / Type / 1964.

Second spécimen, paratype par désignation originale.

C. G. 1966-892.

Ardea purpurea bournei de Naurois, 1966.

Étiquette rouge :

Ardea purpurea / *bournei* Naurois / C. G. 1966 n° 892 / paratype / *Ardea purpurea bournei* / O.R.F.O. 1966 / 36 : 89.

Étiquette blanche :

Coll. Abbé R. de Naurois. / Loc. Archipel du Cap Vert / C. G. 1966 n° 892 / *Ardea purpurea bournei* / Naurois / Loc. Ile de Santiago / 31.X. 1965. Femelle.

Troisième spécimen, paratype par désignation originale.

C. G. 1966-895.

Ardea purpurea bournei de Naurois, 1966.

Étiquette rouge :

Ardea purpurea bournei Naurois / C. G. 1966 n° 895 / Paratype / *Ardea purpurea bournei* Naurois / O.R.F.O. 1966 36 : 89.

Étiquette blanche :

Coll. Abbé R. de Naurois / Loc. Iles du Cap Vert / C. G. 1966 n° 895 / *Ardea purpurea bournei* / Naurois / Loc. Ilha de Santiago / 1964 Sexe ?

Quatrième spécimen, paratype par désignation originale

C. G. 1966-897.

Ardea purpurea bournei de Naurois, 1966.

Étiquette rouge :

Ardea purpurea bournei Naurois / C. G. 1966 n° 897 / Paratype / *Ardea purpurea bournei* Naurois / O.R.F.O. / 1966 36 : 89.

Étiquette blanche :

Col. Abbé R. de Naurois / Loc. Iles du Cap Vert : C. G. 1966 n° 89 / *Ardea purpurea bournei* : Naurois / Loc. ile Santiago / 1964 sexe ?

Remarque : la sous-espèce *Ardea purpurea bournei* de Naurois est incontestablement valable. Immédiatement identifiable, elle diffère largement autant de la sous-espèce nominale que ne le fait la sous-espèce asiatique *Ardea purpurea malinensis* Meyen.

Ardeola podiceps Bonaparte, 1855.

Bonaparte, *Consp. Gen. Avium*, tome 2 : 134.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 250.

Ixobrychus minutus podiceps (Bonaparte, 1855).

Inscriptions sous le socle :

13982 *Ardeola podiceps*, Bp.type / de Madagascar / 1894 / par M. Bernier / [écriture pâle] N. C. N° 214 Blongios nain. / *Ixobrychus m. podiceps* / Type (Bp.) / M. Bernier. Madagascar [écriture plus récente, très nette].

Remarque : dans sa diagnose BONAPARTE précise que l'exemplaire décrit provient de Madagascar et qu'il a été rapporté par Monsieur Bernier.

Cancroma coromanda Boddaert, 1783.

Boddaert, *Table Planches Enlum.* : 5.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 233.

Bubulcus ibis coromanda (Boddaert, 1783).

Inscriptions sous le socle :

heron a [sic] cou jaune rapporté par Sonnerat en 1770 / Duf. Enl 910 / aigrette dorée [écriture très ancienne] monté en 1807 [autre écriture très ancienne] / *ardea comata* B, Gm. / *ardea russata*, Tem. / de la côte de / coromandel / par Sonnerat. enl. 910 / selon toute probabilité / le type de la planche / de Buffon / N° 48 / 6-5 [toutes ces mentions, bien qu'anciennes sont encore bien lisibles] *Bubulcus coromandus* (Bodd) [cette dernière mention est récente et écrite au crayon].

Inscriptions sur l'étiquette :

Bubulcus coromandus / (Bodd.) / Type / Sonnerat Coromandel

Remarques : BODDAERT a décrit *Cancroma coromanda* d'après BUFFON 1780 *Hist. Nat. Oiseaux* 7 : 393 et *Le Crabier de la côte de Coromandel* de DAUBENTON 1765-1781, planche enl. n° 910. D'après l'inscription sous le socle ce spécimen est celui représenté par DAUBENTON. Considéré comme « type de Buffon » il est aussi celui de l'espèce, d'après le Code international de Nomenclature de Zoologie, 3^e éd., 1985, article 72 c 5 : « dans le cas d'un taxon nominal du groupe-espèce fondé sur l'illustration ou une description, ou une référence bibliographique à une illustration ou à une description, le spécimen illustré ou décrit et non l'illustration ou la description » constitue un Type porte-nom acceptable.

Ardea agami Gmelin, 1789.

Gmelin, *Systema Naturae, Aves* : 629.

Type par monotypie.

C. G. n° 1995 – 246.

Agamia agami (Gmelin, 1789).

Inscriptions sous le socle :

Remis les plateaux à réparé [sic] en 1849 / Le plateau portait pour renseignement / Cayenne, par Martin / l'Étiquette, l'Amérique / [mot illisible]. Je crois que c'est le type [mot illisible] / la pl. enl. 859 de Buffon. / 1349-D / [écriture ancienne]. *Ardea agami* / (Gm) / Type de / Buffon / N. C. n° 213 / [écriture récente].

Inscriptions sur l'étiquette :

Ardea agami / (Gm). Type de Buffon / Cayenne ?

Remarques : GMELIN a décrit *Ardea agami* d'après le texte de BUFFON : *Hist. Nat. Oiseaux* 7 : 382 et la planche enlum. pl. 859 « Le Héron Agami de Cayenne » dessinée par DAUBENTON 1765-1781. D'après l'inscription sous le socle ce spécimen est bien celui représenté par DAUBENTON. Considéré comme « type de Buffon » il est aussi le type de l'espèce d'après le Code international de Nomenclature Zoologique, 3^e éd. (1985) article 72 c 5 (voir ci-dessus).

TYPES DE TAXONS TOMBÉS EN SYNONYMIE

Ardea atricollis Wagler, 1827.

Wagler, *Systema Avium*, *Ardea* : 174 sp. 4.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 238.

Ardea melanocephala Vigors & Children, 1826.

Inscriptions sous le socle :

Ardea atricollis Wagl. / du Sénégal / Ech. à m. Fl. Prévost [illisible] 27 Type de / Wagler / 13864 / 388 Manuel / Degland [écriture ancienne; les trois dernières mentions sont inscrites au crayon] *Ardea melanocephala* / (Vig. et Chil.) / Sénégal / *A. atricollis* Wagler Type [écriture plus récente] *Ardea melanocephala* V. & Ch. / (= *Ardea atricollis* type de Wagler) / Fl. Prévost. Sénégal. N.C.18 [écriture plus récente]

Inscriptions sur l'étiquette :

Ardea melanocephala V. & Ch. / (= *Ardea atricollis* Type de Wagler) / Fl. Prévost Sénégal.

Remarques : cet exemplaire représente bien le type de WAGLER car cet auteur précise, à la suite de sa description, que le spécimen décrit est originaire de Sénégal et qu'il provient de la collection de Fl. Prévost. La description d'*Ardea melanocephala* par VIGORS & CHILDREN a la priorité sur celle d'*A. atricollis* Wagler, 1827, car elle est parue en 1826, un an avant celle de WAGLER. *Ardea atricollis* Wagler en est donc un synonyme plus récent.

Ardea novae-hollandiae Vieillot, 1817.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle*, Tome XIV : 436.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

C. G. 1995 – 251.

Nycticorax caledonicus hilli Mathews, 1912.

Inscriptions sous le socle :

Bihoreau Canel / Différent de novae-hollandiae [illisible] c'est l'ardea caledonica [illisible] / Ardea [illisible] [écriture épaisse ancienne, en partie effacée].

Deux étiquettes sont collées sous le socle. Etiquette n° 1 : asie aust. Ctte [pour corvette] le nat.sse [pour naturaliste] / expédit. du Cap. Baudin / an 11 / N.h. par Lesueur / Etiquette n° 2 : Bihoreau de la nelle holland / Ardea novae hollandiae / [les deux derniers mots sont rayés avec au-dessus une mention illisible] Vieill. nouv. dict. / d'hist. nat. 1817. il a échappé une erreur / dans le texte. On a dit gris pour la couleur / du dos et des côtés du col. Type de Vieillot [encre de Chine très palie]. Nycticorax caledonicus Australasiana [illisible] [écriture un peu effacée mais pas très ancienne] / 14015 / N. C. n° 127 / Bihoreau cannelle / Nycticorax caledonicus (Gm.) / A. australasiana (type de Vieillot.) / M. Péron. Australie [écriture plus récente].

Inscriptions sur l'étiquette :

Bihoreau cannelle / Nycticorax caledonicus / (G m) / A. australasiana (Type de Vieillot) / M. Péron. Australie.

Second spécimen, paralectotype, présente désignation.

C. G. 1995 – 253.

Nycticorax caledonicus hilli Mathews, 1912.

Inscriptions sous le socle :

héron de la n elle holland [sic] / ardea novae-hollandiae Vieill. [le nom latin précédent est barré et remplacé par australasia] / [illisible] glissé une erreur dans [illisible] [écriture ancienne, texte en grande partie effacé] Nycticorax caledonicus (Gould) / A. australasiana (V.) Type / N. C. 126 / 14014 / Bihoreau cannelle / Nycticorax calédonicus / (A. australasiana (Type Vieil.) / M. Péron – Australie.

Inscriptions sur l'étiquette :

Bihoreau cannelle / Nycticorax caledonicus / (Gm.) / – A. australasiana (Type de Vieillot) / M. Péron / Australie.

Troisième spécimen, paralectotype, présente désignation.

C. G. 1995 – 252.

Nycticorax caledonicus hilli Mathews, 1912.

Inscriptions sous le socle :

Nycticorax caledonicus, Gm. / A. australasiana (V.) Type / Péron et Lesueur / exp. du C.ne Baudin / d'Australie / 14016 / [écriture ancienne] Bihoreau cannelle / Nycticorax caledonicus (Gm) (A. Australasiana – type de Vieil.) / Mr. Péron – Australie / N. C. – n° 128.

Inscription sur l'étiquette :

Bihoreau cannelle / Nycticorax caledonicus / (Gm) / A. australasiana. (Type de Vieillot) / M. Péron – Australie

Quatrième spécimen, paralectotype, présente désignation.

C. G. 1995 – 254.

Nycticorax caledonicus hilli Mathews, 1912.

Inscriptions sous le socle :

Nycticorax caledonicus (Gm.) / A. australasiana (V.) Type / jeune de l'année / exp. Baudin / Péron et Lesueur / [écriture ancienne] 14017 [écrit au crayon] N. C. n° 129 / Bihoreau cannelle / Nycticorax caledonicus / A. australasiana. type de Vieil. / Mr. Péron – Australie [écriture plus récente]

Inscription sur l'étiquette :

Bihoreau cannelle / Nycticorax caledonicus / (Gm.) / – A. australasiana. (Type de Vieillot) / M. Péron / – Australie

Remarque : les spécimens ci-dessous sont les mêmes que les précédents car VIEILLOT les a redécrits sous un autre nom.

Ardea australasie Vieillot, 1823.

Vieillot, *Tableaux encyclopédiques méthodologiques*, Ornithologie volume 3 : 1130.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

C. G. 1995 – 251.

Nycticorax caledonicus hilli Mathews, 1912.

Second spécimen, paralectotype, présente désignation.

C. G. 1995 – 253.

Nycticorax caledonicus hilli Mathews, 1912.

Troisième spécimen, paralectotype, présente désignation.

C. G. 1995 – 252.

Nycticorax caledonicus hilli Mathews, 1912.

Quatrième spécimen, paralectotype, présente désignation.

C. G. 1995 – 254.

Nycticorax caledonicus hilli Mathews, 1912

Remarques concernant *Ardea novae-hollandiae* Vieillot et *Ardea australasie* Vieillot : VIEILLOT a décrit successivement les quatre spécimens ci-dessus en 1817 et 1823 sous les noms de *novae-hollandiae* et d'*australasie* respectivement. Il s'agit de deux adultes et de deux jeunes : les numéros 126 et 127 concernent les adultes, les numéros 128 et 129 les jeunes.

Ainsi que l'a déjà fait remarquer PUCHERAN (1851), la description que donne VIEILLOT pour *Ardea australasie* (1823) ne diffère de celle qu'il a déjà donnée pour *Ardea novae-hollandiae* que par l'addition d'une diagnose latine qui n'apporte rien de plus. Il résulte de cette double description que le nom subspécifique de *novae-hollandiae* a priorité sur celui d'*australasie*. Toutefois, un *Ardea novae-hollandiae* ayant déjà été employé par LATHAM (1790), *A. novae-hollandiae* Vieillot en est un homonyme objectif et la stricte application des règles du Code aboutit au contraire à conserver *australasie*. Dans les deux cas VIEILLOT s'est trompé en décrivant comme grises les parties qui sont normalement brun-roux chez *Nycticorax caledonicus*.

En 1912 MATHEWS considère que l'Australie est habitée par deux sous-espèces de *N. caledonicus*, à savoir *N. caledonicus australasiae*, Vieillot (il change la dénomination *australasie* de Vieillot en *australasiae*, ce qui ne serait plus possible de nos jours) et *N. caledonicus*

hilli Mathews (1912). La description de cette dernière sous-espèce se résume à : « Diffère de *N. c. australasiae* par sa coloration plus pâle ». La description de VIEILLOT étant erronée, celle de MATHEWS l'est aussi. Lors de la rédaction du troisième volume de son « *Birds of Australia* » (1913-1914), MATHEWS, après avoir pris connaissance de la description de VIEILLOT, exprime l'avis que ce dernier ne pouvait pas avoir eu en main d'authentiques *N. caledonicus* et a supprimé la sous-espèce *australasiae* pour ne conserver pour l'Australie (y compris la Tasmanie) que la sous-espèce *hilli*. La stricte application du Code conduirait à désigner la sous-espèce australienne sous le nom de *australasiae* puisque malgré l'erreur de VIEILLOT nous avons bien des spécimens qui sont d'authentiques *N. caledonicus* rapportés par l'expédition Baudin en 1800-1804. Cependant, ce choix serait sans doute malheureux pour la stabilité de la nomenclature car ce nom n'a plus été employé depuis la parution de *Birds of Australia* et est donc devenu un *nomen oblitum*.

Ardea bilineata Cuvier in Lesson, 1831.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 574.

Premier spécimen, lectotype, présente désignation.

C. G. 1995 – 242.

Ixobrychus flavicollis flavicollis (Latham, 1790).

Inscriptions sous le socle :

Ardea bilineata cv / Par M Labillardière / de Java [écriture ancienne] / 13958 / [très pâle] *N. C.* N° 217 / [très net] *Ardea flavicollis* / (Cuv. Type) / [écriture plus récente].

Inscriptions sur l'étiquette :

Ardea flavicollis / *A. bilineata* (Cuv.) T. / Labillardière Java.

Second spécimen, paralectotype, présente désignation.

C. G. : 1995 – 243.

Ixobrychus flavicollis flavicollis (Latham, 1790).

Inscriptions sous le socle :

heron de Java / Par M. Leschenault / 1807 [écriture ancienne] / *Ardea bilineata* (cuv.) [autre écriture ancienne] type [écriture plus récente] / *Ardea flavicollis* (Lath) / 13959 / [même écriture que celle de type] / *N.C.*— N° 218

Inscriptions sur l'étiquette :

Ardea flavicollis / *A. bilineata* (Cuv.) T. / Labillardière Java.

Remarques : la description originale d'*Ardea bilineata* se trouve dans le traité de LESSON (CUVIER ne l'ayant jamais publiée lui-même). Cependant LESSON attribue bien cette espèce à CUVIER puisqu'il la nomme *Ardea bilineata*, Cuv. Dans ce cas la dénomination d'*Ardea bilineata* Cuv. est gardée (C.I.N.Z. 3^e édition, 1985 : 90, article 50.a.). La diagnose très succincte de LESSON se termine par « De Java. (Labillardière). » Ce sont donc bien les spécimens ci-dessus qu'il a examinés. Le nom spécifique de *bilineata* Cuv. n'est cependant qu'un synonyme plus récent de celui de *flavicollis* Latham (1790).

Ardea australis Cuvier in Lesson, 1831.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 572.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 244.

Ixobrychus flavicollis flavicollis (Latham, 1790).

Inscriptions sous le socle :

Ex(tion) Baudin / *Ardea flavicollis* (Lath.) / *A. australis* (Cuv.) type / [cette inscription presque effacée] / Ext Baudin [écrit au crayon] / 13960 [presque effacé] N. C. N° 219 [très net].

Pas d'étiquette.

Remarques : comme pour le taxon précédent la description originale se trouve dans le traité de LESSON (1831) et CUVIER ne l'a jamais publiée lui-même. Cependant LESSON attribue ce taxon à CUVIER puisqu'il le nomme *Ardea australis* Cuv. On garde donc la dénomination d'*Ardea australis* Cuv. (C.I.N.Z. 3^e édition, 1985 : 90, article 50.a.). Cette diagnose très succincte ne comprend que quelques lignes et LESSON n'a pas remarqué que *Ardea bilineata* et *Ardea australis* représentaient en fait la même espèce. Dans sa description LESSON précise que le spécimen qu'il a examiné est celui du « voyage de Péron » (Péron était un des membres de l'expédition Baudin). Le nom spécifique d'*australis* Cuv. n'est qu'un synonyme plus récent de celui de *flavicollis* Latham (1790).

Ardea nivea, Cuvier in Lesson, 1831.

Lesson, *Traité d'Ornithologie* : 575.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 235.

Egretta intermedia intermedia (Wagler, 1829).

Inscriptions sous le socle :

reçu en 1818 chenault pondicherie [texte ancien repassé à l'encre de chine par la suite] N° 398 / *Ardea alba* [presque effacé] / *Ardea nivea*, / Cuv. (type) / Jeune avec [effacé] / mais [effacé] / *A. egrettoides* / les tarsi plus longs qu'[illisible], / le bec blanc tandis qu'il est noir / dans le garzetta; et taille moindre / que *ardea timoriensis* cv qu'il égale pour / la blancheur. Val. [écriture ancienne] / N. C. N° 53 [autre écriture] / *Ardea intermedia* / *A. Nivea* (Cuv.) Type / 13886 [écriture récente] 13886 [noté deux fois au crayon]

Inscription sur l'étiquette :

Moyenne Aigrette / *Egretta intermedia* / Type (Wagl.) / M. Leschenault Pondichéry.

Remarques : comme dans les cas précédents la description originale d'*Ardea nivea* se trouve dans le traité de LESSON (1831) qui attribue cette espèce à CUVIER sans doute à cause de la mention sous le socle. Dans sa diagnose LESSON note que le spécimen décrit se trouve à la Galerie de Paris, qu'il provient de Pondichéry et qu'il a été rapporté par Leschenault, ce qui correspond bien au spécimen C. G. 1995 – 235. La diagnose de LESSON, très succincte, est postérieure à celle de WAGLER publiée en 1827 et *Ardea nivea* Cuv. en est donc un synonyme plus récent.

***Ardea pealii* Bonaparte, 1826.**

Bonaparte, *Annals of the Lyceum of Nat. Hist. of New-York* 11. : 154.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 234.

Egretta rufescens rufescens (Gmelin, 1789).

Inscriptions sous le socle :

Individu / figuré American / Ornithology / 4 [illisible] 26 fig 1 [texte presque effacé] / Ardea peali, des Etats unis. / Floride / Bonap. / (type de l'espèce) de la collection / donnée par le Prince / Charles Bonaparte / en 1854. / (Cat n° 1199). / Ardea rufa / (Bodd.) / N. C. n° 212 / Dicromanassa rufescens (= Ardea Pealii / type de Bonap.) / coll. Ch. Bonap. Floride.

Inscriptions sur l'étiquette :

Aigrette roussatre / Dichromanassa rufescens / (Gm) (Ardea Pealii Type de Bp.) / Coll. Ch. Bonaparte Floride.

Remarques : ce spécimen est le type par monotypie d'*Ardea pealii* Bn. Il a fait l'objet d'une représentation graphique dans BONAPARTE 1833 (*American Ornithology* vol. IV : 96, pl. 26 fig.1.) Le nom spécifique de *pealii* Bn. n'est qu'un synonyme plus récent de *rufescens* Gmelin (1789), décrit bien antérieurement.

***Ardea ardesiacea* Lesson, 1831.**

Lesson 1831, *Traité d'Ornithologie* : 575

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 247.

Egretta caerulea (Linné, 1758).

Inscriptions sous le socle :

Ardea Coerulea, L / de Cayenne par M. Poiteau avril 1822 / (n° 135) / Ardea / ardesiacea, / Lesson / (type) / 13911 [écriture ancienne presque effacée] N. C. 211 / Petit heron cendré d'Amérique / Florida caerulea (L) / (= Ardea ardesiacea, type de Lesson / M. Poiteau – Cayenne) [écriture récente]

Inscriptions sur l'étiquette :

Petit Héron cendré d'Amérique / Florida caerulea (L.) / (= Ardea ardesiacea type de Lesson) / M. Poiteau Cayenne.

Remarques : d'après les mentions portées sous le socle, ce spécimen est bien celui décrit par LESSON qui, de plus, précise dans son ouvrage qu'il provient de Cayenne. La description d'*Ardea caerulea* Linné (1758) étant bien antérieure à celle de LESSON, *Ardea ardesiacea* Lesson n'en est qu'un synonyme plus récent. C'est de plus un homonyme objectif plus récent de *Ardea ardesiaca* Wagler, 1827.

***Ardea collocephala* Wagler, 1827.**

Wagler, *Systema Avium*, Ardea : 189 sp. 34.

Type par monotypie.

C. G. 1995 – 255.

Nycticorax violaceus (Linné, 1758).

Inscriptions sous le socle :

le bihoreau de Cayenne. buff. Enl 899 / [écriture très ancienne : les 4 mentions qui suivent sont de la même écriture mais ont été rayées par la suite] ardea cayennensis Gm. / ardea violacea. Will vol 8 pl 65 fig 1 / le bihoreau à [mot illisible] / ardea sexsetacea Vieill. Dict. [l'écriture suivante est ancienne et la même que celle qui a rayé les mentions précédentes] / Ardea violacea L. / A. violacea et cayennensis, Gm. / A. violacea et A. sexsetacea Vieill. / A. callocephala Wagl. (T). [l'écriture suivante est plus récente] Martin / De Cayenne [rayé] / de Cayenne / par / Martin / Nycticorax violaceus (L.) / a. callocephala (Wagl.) [autre écriture récente] / Bihoreau à tête jaune / Nyctanassa violacea (L.) / A. violacea (type de Wagl.) / M. Martin. Cayenne [chiffre presque effacé, très ancien et repassé au crayon] 14034.

Inscriptions sur l'étiquette :

Bihoreau à tête jaune / Nyctanassa violacea (L.) / A. violacea (type de Wagl.) / M. Martin. Cayenne.

Remarques : dans son travail, WAGLER (1827) mentionne que le spécimen qu'il décrit se trouve au Muséum de Paris. Après sa diagnose il donne une liste de synonymes à savoir : *Ardea violacea* Wil., Bihoreau de Cayenne Buff., *Ardea cayennensis* Gm. et *Ardea sexsetacea* Vieillot. Dans ces conditions on ne sait pour quelles raisons WAGLER a donné à ce taxon le nouveau nom d'*Ardea callocephala*, qui n'est qu'un synonyme plus récent d'*Ardea violacea* Linné.

SPECIMENS CONSIDÉRÉS À TORT COMME DES TYPES

Ardea mokoko Vieillot, 1817.

Vieillot, *Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle* Tome XIV Ardea : 440.

C. G. 1995 – 237.

Botaurus lentiginosus (Rackett, 1813).

Inscriptions sous le socle :

New-york / par M. milberts 1818 / Ardea minor orn. am. / 8 pl.65 fig 3 / Ardea stellaris Gm Edw 136 / Ardea lentiginosa mont. et Shaw [écriture ancienne sur une étiquette collée sous le socle] / placé à tort parmi les oiseaux d'Europe. / [2 mots illisibles] 13995 / Butor à bandes noires [écriture ancienne] 397 cat. Degland [écrit au crayon] Ardea / mokoko / Vieill. / Wagl. [écriture ancienne] Botaurus lentiginosus / (mont.) / A. mokoko [sic] / type / N. C. n° 207 [écriture plus récente] Butor de la baie d'Hudson / Botaurus lentiginosus (mount.) / A. mokoko [sic] Type de Vieillot / M. Milbert Etat Unis.

Inscriptions sur l'étiquette :

Butor de la Baie d'Hudson / Botaurus lentiginosus / (Mont.) (A. mokoko [sic] Type de Vieill.) / M. Milbert Etats-Unis.

Remarques : le *Nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle* ayant paru en 1817 et ce spécimen ayant été rapporté du Nouveau Monde par M. Milbert en 1818, il ne s'agit probablement pas de l'exemplaire décrit par VIEILLOT. Plus tard, il a été examiné par WAGLER qui s'est contenté de reprendre le nom que lui avait donné VIEILLOT. Il ne s'agit donc pas d'un type au regard du Code. Dans sa description originale, VIEILLOT, qui savait qu'il s'agissait d'un oiseau américain, l'a nommé mokoko, d'après une appellation indigène, nom repris par WAGLER (1827). L'orthographe «mokoko», utilisée par nombre d'auteurs du XIX^e siècle, est erronée.

C'est à RACKETT (1813) qu'il faut attribuer le nom de *lentiginosus* et non à MONTAGU (1813). En effet, la seconde édition du *Catalogue de Pultney*, dans laquelle RACKETT décrit cet oiseau qu'il croyait européen, est parue un peu avant le travail de MONTAGU. Le nom spécifique de *lentiginosus* Rackett, 1813 a donc la priorité. La mention «placé à tort parmi les oiseaux d'Europe» se rapporte sans doute à la place que ce spécimen occupait dans la Galerie.

Ardea melanoptera Cuvier in Pucheran, 1851.

Pucheran, *Rev. Mag. de Zool.* : 375.

Premier spécimen, *nomen nudum*

C. G. 1995 – 248

Ixobrychus sinensis (Gmelin, 1789).

Inscriptions sous le socle :

Ardea melanoptera cv / 13966 [ancien, presque effacé] / *Ardea sinensis* / Gm / *Ard. lepida* / Horsf. Wagl. / des Mariannes Exp.^{lion} / freycinet 1820 [écriture ancienne] / *Ardetta sinensis* (Gm) / *A. melanop.* / (Cuv.) / type [écriture plus récente] / Blongios de Chine / *Ixobrychus sinensis* / Type *A. melanoptera* / (Gm) / L'Uranie. I. Mariannes / N. C. N° 215.

Inscriptions sur l'étiquette :

Blongios de Chine / *Ixobrychus sinensis* / (Gm) / Type / L'Uranie I. Mariannes / [ajouté à la main sur l'étiquette imprimée après la mention : type] *A. melanoptera* (Cuv.).

Second spécimen, *nomen nudum*.

C. G. 1995 – 249.

Ixobrychus sinensis (Gmelin, 1789).

Inscriptions sous le socle :

Ardetta sinensis (Gm) / *A. melanoptera* (Cuv. type) / Exp. freycinet 1820 / Iles Mariannes / 13970 [écriture pâle] / N. C. N° 216 / Blongios de Chine / *Ixobrychus sinensis* (Gm) / Type *A. melanoptera* (Cuv.) / L'Uranie. I. Mariannes [écriture plus récente].

Inscriptions sur l'étiquette :

Blongios de Chine / *Ixobrychus sinensis* / Type (Gm.) / *A. melanoptera* (Cuv.) [La mention *A. melanoptera* (Cuv.) est ajoutée à la main sur l'étiquette imprimée] / L'Uranie I. Mariannes.

Remarque : CUVIER n'a pas publié de description de ce taxon. PUCHERAN se contente de le citer et l'attribue à CUVIER (sans doute à cause des mentions sous le socle), également sans en donner de description. Il s'agit donc d'un *nomen nudum* et ces deux spécimens ne sont pas des types au sens du Code.

Gorsachius melanolophus Raffles, 1822.

C. G. 1995 – 240

Gorsachius melanocapthalus Raffles, 1822.

Inscriptions sous le socle :

Héron de l'Inde / par Brossard / fev. 1829 / 14007 / Nycticorax Goisagi Tem [presque effacé volontairement] Individu décrit / Consp. / Avium vol ii p. 138 [écriture ancienne]
Type / Botaurus melanolophus / (Raff.) / Gorsakius typus Pucheran / N. C. 143 / [écriture plus récente] Petit Butor de Malaisie / Gorsachius melanolophus / (Raff.) / M. Brossard – Inde. [écriture récente]

Inscription sur l'étiquette :

Petit Butor de Malaisie / Gorsachius melanolophus / (Raffl.) / M. Brossard Inde.

Remarques : ce spécimen est un mâle en plumage nuptial. Nous avons déjà indiqué plus haut (voir *goisagi*) que BONAPARTE (1855) s'était mépris à son sujet en le décrivant comme étant l'adulte de *Gorsachius goisagi* (Tem.). La mention «type» apposée sous le socle signifie seulement que ce spécimen était considéré, avec celui de *goisagi*, comme type du genre *Gorsachius* Bonaparte.

Remerciements

Nous remercions ici le Prof. W. J. BOCK (New York) ainsi que le Prof. J. VUILLEMIER (New York) pour leurs critiques constructives du manuscrit de cet article.

RÉFÉRENCES

(autres que celles des descriptions)

- BONAPARTE C. L., 1855. — *Conspectus Generum Avium*. Éd. Brill, Leyde.
HANCOCK J. & ELLIOTT H., 1978. — *The herons of the world*. London Editions, Londres.
MATHEWS G. M., 1912. — A reference list to the birds of Australia. *Novit. Zool.* 18: 171-455.
— 1910-1927. — *The Birds of Australia*, 12 vol. Witherby, Londres.
MAYR E. & COTTRELL G. W. (eds.), 1979. — *Peter's Check-list of Birds of the World*, vol. 1, 2nd éd. Cambridge, Muséum of Comparative Zoology.
STRESEMANN E., 1951. — *Die Entwicklung der Ornithologie*. F. W. Peters, Berlin W 15.
VOISIN C., 1993. — Liste des spécimens types d'ibis (*Threskiornithinés*) de la collection du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. *Oiseau et R.f.O.* 63 : 45-53.
VOISIN J.-F., 1992. — Liste provisoire des types d'oiseaux des collections du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris. 1. Péléciformes. *Oiseau et R.f.O.* 62 : 162-172.
— 1995. — Liste des types d'oiseaux des collections du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. 3. Podicipédiformes. *Bull. Mus. natl Hist. nat., série 4, A 17* (3-4) : 345-351.